

**Nimi:****Hoitava Lääkäri:****Henkilötunnus:****Hoitaja:****Pvm:**

## OIREETON

- ei oireita edes riehakkaissa leikeissä

## VÄLTÄ:

- tupakan savua ja oireita aiheuttavia allergeenejä

SÄÄNNÖLLINEN HOITAVA JATAI PITKÄVAIKUTTEINEN AVAAVA LÄÄKITYS : Suihkeet annetaan tilanjatkeella (Babyhaler tai Nebunette)

Lääke:

Annos:

## LIEVÄT OIREET

- yskää
- lievää hengityksen vinkunaa
- nuhaa
- tihentynyt hengitys  
<12 kk ikäisellä >50/min  
>=12 kk ikäisellä >40/min
- oireita öisin tai rasituksessa  
**TAI**
- imeväisillä myös huono syöminen, muutos nukkumistavoissa ja kärtyisyys saattavat viitata astman pahenemiseen

NOPEAVAIKUTTEINEN AVAAVA LÄÄKITYS:

Lääke:

Annos:

SÄÄNNÖLLISEN LÄÄKITYKSEN TEHOSTUS, JOS AVAAVAN LÄÄKKEEN TARVETTA: >2 x /viikko, >3 x /vrk, tai jos selvät flunssan oireet.

Lääke:

Annos:

## MERKITTÄVÄT OIREET

- uloshengitysvaikeus pahenee tehoste tusta lääkityksestä huolimatta
- uloshengitys selvästi vinkuu ja/tai on pitkittynyt
- lapsella tukala olo
- vatsalihakset selvästi apuna hengityksessä
- lapsella vaikeuksia kävellä, puhua, syödä tai leikkiä  
**TAI**
- lapsen yleistila alentunut

HOITO-OHJEET:

- anna avaavaa lääkettä tiheästi, esim. 2 suihketta ½ tunnin välein  
- jos se ei auta, tai jos lasta ahdistaa vielä 2 tunnin kuluttua, hakeudu välittömästi lähimpään päivystävään lääkäriin
- hätätilanteessa voit antaa 4 suihketta avaavaa lääkettä kerralla (jos lapsesi saa sumuteliuosta, noudata tarkasti annettuja ohjeita)
- soita tarvittaessa päivystävälle lääkäriille ja kysy ohjeita:

MUU LÄÄKITYS:

Lääke:

Annos:

MUUT OHJEET:

ALLERGIAT: